



## CEA fald til 6 på mindre end én måned på lav dosis metronomisk kemoterapi

27-04-10

En dansk mand f.1928 blev opereret i marts 2009 for cancer i tyktarmen nær blindtarmen (cancer coeci) med fjernelse af højre side af tyktarmen. Adenocarcinom. Man fandt samtidig lunge- og levermetastaser, og også regionale lymfeknudemetastaser.

Påbegyndte behandling den 13.5 2009 med oxaliplatin, avastin og xeloda. Patienten fik 7 behandlingsserier hermed, sidst den 06.10.09. Tumormarkøren CEA faldt under denne behandling fra 620 til 10. CT scanning viste, at lunge- og levermetastaserne var blevet mindre. Imidlertid havde patienten svære bivirkninger af kemoterapien i form af diarre, neuropati, kvalme, træthed, og dårlig appetit. Patienten havde et længerevarende indlæggelsesforløb på Kalundborg Sygehus fra 16.10 til 6.11.09, hvor man måtte give ham intravenøs ernæring med Structokabiven. Man stoppede derfor kemoterapien efter patientens ønske, da han ikke syntes at bivirkningerne stod mål med virkningen, og primo februar 2010 blev han scannet igen, hvor man fandt vækst af metastaserne.

På onkologisk afdeling kunne man ikke tilbyde yderligere kemoterapi, og han kommer derfor på Humlegården fra den 12.3 – 1.4.2010.

Hans CEA var 10 ultimo november 09, den 16.2 var den steget til 74, og den 16.3 efter ankomsten til Humlegården var den steget til 132.

Under opholdet blev han behandlet med lav dosis metronomisk sendoxan 50 mg hver anden dag (på grund af hans alder på 82 år), med LDN (lav dosis naltrexone) 4,5 mg dgl. og misteltenpræparatet Helixor A i stigende dosering sammen med marietidsel, curcumin og vore homøopatiske levermidler.

Bortset fra en mindre lungebetændelse, som blev penicilinbehandlet, havde patienten det fint under opholdet på Humlegården, hvor han også blev behandlet med lokal hyperthermi hver anden dag, og desuden fik rehatron, hyperfoton/magnetfelts terapi og desuden forskellige ilt behandlinger. Endvidere med motion, som vi lægger meget vægt på.

Efter hjemkomsten har han fulgt vores program til punkt og prikke, og allerede den 12.4 var CEA faldet til 6. Altså en reduktion fra 132 til 6 på mindre en én måned, og vel og mærke på en terapi, som har været uden bivirkninger.

Ved vor seneste kontakt med patienten den 25.4.10 har han det fint og går lange ture.