



## Æggestokscancer responderer fint på komplementærbehandling

16-02-11

En dansk kvinde f. 1954 fik i midten af august 2007 stillet diagnosen æggestokskræft med et CA-125 på godt 6000 og en 10 x 15cm stor svulst i højre æggestok.

Patienten opereres den 18.9.07 med fjernelse af livmoder, æggestokke og æggeledere, og omentet. Serøst adenocarcinom, stadium 1C. Hun fik herefter eksperimentel behandling med carboplatin og Avastin 6 x fra 17.10.07 til 30.1.08. Patienten fortsatte herefter med Avastin alene og fik 10 behandlinger hermed, afsluttet 24.4.08. Man stoppede med Avastin på grund af muskel- og ledgener. I løbet af efteråret 2008 begynder CA-125 at stige og 26.11.08 er det på 45.

Tyndtarmen får nu carsinose-udseende, og ved laparoskopisk biopsi den 10.12.08 finder man tumorceller i væsken i bughulen, samt metastase i en proces over leveren. CA-125 stiger til 60, og patienten får nu 5 behandlinger med taxotere/carboplatin indtil 3.4.09, hvor CA-125 falder til 13. Siden har patienten ikke fået konventionel kemoterapi, men patienten fik besked på, at hun havde en kronisk sygdom.

Hun kommer på ophold på Humlegården primo september 2009, fordi hun ikke vil sidde passivt derhjemme og vente på at CA-125 skal stige igen. Vi påbegynder behandling med misteltenpræparatet Helixor M i stigende dosering samt LDN (lav dosis naltrexone), men da markøren CA-125 den 2.10 stiger til 31 påbegynder vi også lav-dosis metronomisk kemoterapi med sendoxan 50 mg daglig.

Medio marts 2010 stopper vi med sendoxan, da alt er fint. Primo juni stiger CA-125 til 36, uden vort vidende, og primo november er tallet steget til 73. CT scanning viser nu en retroperitoneal proces bag bughulen, som er vokset fra 16 mm i marts til 36 mm den 10.11, og der mistænkes yderligere to processer på henholdsvis 23 og 13 mm.

Patienten kommer ambulant på Humlegården den 18.11, og vi påbegynder igen sendoxan 50 mg dagligt, og ordinerer nu også diabetesmidlet Metformin 500 mg x 2 (som virker godt på kræft), samt angiogenesehæmmeren Celebrex 200 mg x 2. Endvidere øger vi Helixordosis til 100 mg hver anden dag.

Allerede den 21.12.10 viser PET-CT scanning, at knuden nu kun er på 23 mm. Desuden en PET positiv lille lymfeknude beliggende i venstre lyske. Eller i.a.

Ved vor seneste kontakt med patienten den 16.2.2011 har hun det fint og går i træningscenter 4 gange om ugen. Hendes CA-125 er nu 20 og befinder sig igen i normalområdet.

På den onkologiske afdeling kalder de hende skiftevis et mysterium og et mirakel.