

Humlegaarden



Brystkræft

Fru K.K. er født i oktober 1937. Efter at have gået i et par år med en knude i venstre bryst, blev patienten opereret den 7. januar 1983 med fjernelse af knuden, som viste sig at være ondartet. 3 dage senere fjernede man hele brystet samt lymfeknuder. Der var spredning til 3 ud af 3 fjernede kirtler i armhulefeltet og til 2 ud af 3 kirtler i processus axillaris (d.v.s. brystets "hale", der strækker sig lidt ind i armhulen). Svulststørrelsen 1 cm.

Patienten var således i en højrisikogruppe, og man påbegyndte den 3. februar 1983 kemoterapi med Endoxan, Metrotrexat og 5-FU 1 x månedligt og fortsatte hermed indtil september samme år. Desuden fik patienten antiøstroget Nolvadex 30 mg dagligt, som hun fik et års tid.

Patienten kom på Humlegaarden lige efter påbegyndt kemoterapi medio februar 1983 og påbegyndte injektioner med misteltenpræparatet Helixor Pini (fra fyrretræet) og vores sædvanlige svaleurtdråber for leveren (Chelidonium Comp).

Velbefindendet var godt i forbindelse med denne behandling indtil 1985, hvor hun havde gentagne influenzatilfælde i marts, april og maj samt lungebetændelse på venstre lunge primo august og på højre lunge ultimo august. Hun var meget medtaget af denne sidste lungebetændelse og røntgen viste en plet på højre lunge, som siden forsvandt. Patienten fik antibiotika, og vi øgede Helixor-dosis til 50 mg hveranden dag. Patienten havde også i efteråret 1985 så meget hovedpine, at man foretog en hjernescanning, som imidlertid viste normale forhold.

Hun fik først nu foretaget en undersøgelse af sengestedet for vandårer, og efter denne blev sengen flyttet.

Patienten havde influenza i 1988, og i december 1990 var der igen noget på lungerne, som blev kontrolleret 3-4 gange med 1 måneds mellemrum.

Fra juli 1992 til oktober 1992 havde hun næsten konstant lav feber op til 38 grader, og man fandt kæbehulebetændelse på højre side, som blev punkteret. Patienten var temmelig stakåndet, når hun skulle gå bare en etage op.

Tilstanden rettede sig, men i sommeren 1993 havde patienten en halsbetændelse, som varede halvanden måned. I 1994 fik hun rekonstruktion af venstre mamma.

Ved kontakt med patienten i februar 2007 havde hun det fint. Hun har indtil 2004, altså i 21 år fulgt sin Helixor-behandling til punkt og prikke. Patienten oplyser, at hendes cancer ikke er kommet igen.

Humlegaarden



Vor allersæneste kontakt med pt. er i april 2008, hvor hun stadig har det fint i en alder af 70 år, selv om hun har udviklet KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) i de sidste par år. Hun har aldrig selv røget, men været udsat for passiv rygning i sit ægteskab i 25 år. Hun er nu enke, men er glad for sin lille have og har en god vennekreds, så livskvaliteten er fin.

Vi ser ofte disse langvarige forløb uden recidiv af brystcancer under misteltenbehandling, men selvfølgelig er der mange brystkræftpatienter, som også uden misteltenbehandling lever i mange år.