

Humlegaarden



KRÆFT I BUGSPYTKIRTELEN (PANCREAS) FRA 2004

Man fandt en tumor i hovedet af bugspytkirtelen, som stammede fra en invasiv cancer i den nedre del af galdegangen, som befinder sig i bugspytkirtelen. Et såkaldt cholangiocarcinom i pancreas.

Patienten blev opereret den 29. september 2004 med en såkaldt Whipple operation, hvor svulsten blev fjernet. Der var spredning til en ud af fem fjernede lymfeknuder ved pancreas. Der var også peri-neural invasion og spredning til galdegangens udmunding i tolvfingertarmen. Tumor 1,5 cm i diameter, moderat differentieret. Der var frie resektionskanter.

Patienten var i velbefindende efter operationen. Patienten er en canadisk kvinde født 1936, som udviklede gulsot i

Hun kom på et 3 ugers ophold på Humlegaarden fra 1.6 – 22.6 2005 og blev startet på Iscador M 20 mg 3 gange per uge samt LDN (lav dosis naltrexon 4,5 mg daglig) og diverse homøopatiske midler samt Iperoxo.

Hun havde let forhøjede tumormarkører (CA-19-9 på 46 og ferritin 553) Desuden let forhøjet alkalisk fosfatase og ASAT (leverparametre).

Patienten følger sine behandlinger hjemme i Canada, men i 2007 kommer der stigende CA-19-9 og hun skiftes til misteltenpræparatet Helixor M. Man finder et infiltrat i højre lunge, og beslutter sig for at operere patienten. Dette sker den 8. april 2008, og på grund af multiple metastaser (12 i alt i størrelsen 2-25 mm) fjerner man nedre lungelap på højre lunge og foretager kileresektion af øvre højre lungelap, hvor der findes 2 metastaser.

CA-19-9 var 900 før operationen, men den 13. maj 2008 var den 2990, altså stigende trods operationen.

Hun kommer på ophold på Humlegaarden fra den 25. maj til den 23. juni 2008, hvor vi øgede Helixor dosis til 300 mg hver anden dag og påbegyndte metronomisk kemoterapi med sendoxan 50 mg daglig. CA-19-9 fortsatte med at stige, til over 9000 (surge? se under tumormarkører) og derfor skiftede vi medio juli til sendoxan 50 mg 2 gange daglig i ulige uger og vepesid (=etoposid) 50 mg 2 gange daglig i lige uger., og nu er tumormarkøren faldet

Humlegaarden



signifikant, og ved vor seneste kontakt med patienten 25. september 2008 motionerer patienten hver dag og har ingen åndenød. Hun har alle årene også brugt LDN (lav dosis naltrexon)