



Fibrosarkom med lungemetastaser

21-03-2011

T.Ø., født 1954, opdagede medio oktober 1990 en lille knude på midten af højre lår. Den blev fjernet, da hun stadigvæk havde den medio januar 1991. Mikroskopi viste: fibrossarcom-lignende tumorcæve, malignitetsgrad 3, det vil sige en kræftsvulst udgået fra bindevævet. Patienten fik herefter to re-operationer i området for at få den sidste rest af kræftsvulsten med. Pt. var herefter på Humlegaarden fra 18.3 1991 til den 5.4 1991, påbegyndte behandling med misteltenpræparatet Iscador PchHg samt Cetr. pr. (islandsk mos) samt diverse homøopatiske behandlinger. Pt. fik herefter i Norge 25 strålebehandlinger indtil den 22.5. Patienten tålte strålebehandlingen godt, kom tilbage på Humlegaarden i 1½ uge fra den 27.5. Hun fortsatte med misteltenbehandling i nogle år og havde det godt indtil 1997, hvor hun begynder at føle sig træt og udslidt, bl.a. på grund af sit arbejde med psykisk udviklingshæmmede børn.

I foråret 1997 får patienten desuden stikninger i højre lunge af svingende natur. Hun kommer på Humlegaarden igen godt 2 uger indtil 1.5 1997 og genoptager misteltenbehandling. Røntgen af lunger viste forandringer på venstre lunge siden maj 1996, men man troede, at disse var godartede. Da man imidlertid tog biopsi herfra i januar 1998, fandt man kræftceller, som lignede den primærkræft i 1990. Man fandt også i underlappen på højre lunge en metastasesuspekt læsion på 1 cm i diameter.

Patienten kommer tilbage på Humlegaarden den 18.1 1998 og genoptager misteltenbehandling med præparatet Helixor Mali.

I april-maj 1998 blev patienten opereret på det norske Radiumhospital, hvor man fjernede metastaser på såvel højre som venstre lunge.

Vor seneste kontakt med patienten var i juni 2002, hvor hun var i topform. Og også senere i 2004.

Vi er blevet informeret om, at patienten afgik ved døden i sommeren 2006.