



Lunge-Metastaser

En 47-årig kvinde fra New York, M.B., var på HG fra den 30.7. 2001 til den 16.8. 2001.

I juli 1997 fik patienten fjernet en knude i højre armhule, og den viste sig at være kræft. Infiltrerende ductalt carcinoma af apokrin type, dvs. fra en svedkirtel. Der var 3 bittesmå pletter på lungerne, og der var kræft i en lymfeknude over nøglebenet. Hun påbegyndte behandling med misteltenspræparatet Iscador M og senere P i USA og fulgte forskellige kostprogrammer. Kræften voksede langsomt, og da hun kom på HG, havde hun fået multiple lungemetastaser og multiple metastaser i hud og over venstre nøgleben. Også en hudmetastase i venstre side af hovedbunden. Vi startede på vort program med forskellige antroposofisk-homøopatiske midler og skiftede fra Iscador til misteltenpræparatet Helixor M. Desuden Tamoxifen og Zoladexinjektioner. Endvidere startede vi hende på behandling med tetrathiomolybdat og gav hende 2 dendritcellevaccinationer under opholdet og 3 mere i oktober og november, og disse fik hun hjemme i New York. Hun fik desuden 3 helkropshyperthermier og lokal hyperthermi hver anden dag under opholdet. Hun fortsatte sin TM-behandling i USA. Vi talte sidst med patienten den 17.12. 2002 - 16 måneder efter hendes ophold på Humlegaarden, og hun var i fin form.