



Maligt melanom - metastaser halveret på 1 ½ måned

22-04-10

En dansk mand, født i 1969, får i 1999 fjernet et maligt melanom (modermærkekræft) på venstre skulder. Fra september 2008 får patienten smerter i højre nyreregion, og i oktober 2008 får han synligt blod i urinen.

CT scanning den 23.12.2008 viser stor tumorproces i øvre, højre nyrepol (6,4 x 5,7 x 6 cm) samt multiple metastaser i samtlige lungesegmenter i begge lunger. Nyrebiopsi den 09.01.09 er lidt svær at tolke, og først den 26.01.09 er man sikker på, at det er det maligne melanom, der er kommet igen.

PET-CT scanning den 05.02.09 viser nu, udover den store proces i højre nyre, multiple lunge- og knoglemetastaser samt flere PET-positive processer under huden i højre aksil, venstre overarm og højre hæl samt hofteregion. CT scanning 23.01.09 af hjernen viser ingen hjernemetastaser. Patienten henvises nu til PEG-Introna (= Interferon-) og Il-2 (Interleukin-) behandling på onkologisk afdeling i Odense.

Man foretager her ny CT scanning af hjernen den 03.03.09, og denne viser, at der i den lange ventetid er kommet hjernemetastaser. MR-scanning den 16.03.09 bekræfter, at patienten har to hjernemetastaser samt udbredte metastaser i mediastinum (brystskillevæggen). Patienten kan nu ikke modtages i Odense, før han har fået strålebehandling mod hjernen, og den 02.04.09 får han stereotaktisk strålebehandling mod hjernemetastaserne på Rigshospitalet.

I mellemtiden har patienten mistet tålmodigheden med den lange ventetid, da han nu har ventet 3 måneder, siden man fandt den store proces i højre nyre. Denne er i ventetiden vokset til 12,2 x 7,5 cm.

Han kommer på Humlegaarden den 23.03.09, og samme dag påbegynder vi behandling med kemostoffet Temodal i vanlig 5/28 dosering, og desuden påbegyndes behandling med angiogenesehæmmeren Celebrex og misteltenpræparatet Helixor P i stigende dosering. Desuden foretages enzymbehandling og lperoxobehandling, behandling med lokal hyperthermi og andre lokalbehandlinger.

Endelig, den 13.05.09 (4½ måned efter fundet af den store nyretumor), kan han modtages i Odense til en samtale om behandling af hans multiple sygdomslæsioner. Da CT-scanning lige forinden har vist, at disse er formindsket med 50% under behandlingen på Humlegaarden, ønsker man ikke at behandle ham. Metastaserne i hjernen er fuldstændig forsvundet, og patienten har det særdeles fint.

Sygdomshistorien illustrerer, at ventetiden i det offentlige system er for lang, og i ovennævnte tilfælde venter patienten på en behandling, som giver ham 7% chance for komplet remission og 20% chance for et mindre respons.

Man kan stille det spørgsmål, hvorfor man ikke omgående, den 26.01.09, hvor man er sikker på diagnosen, påbegynder Temodal behandling, som er en veldokumenteret behandling for malignt melanom. I ventetiden udvikler patienten hjernemetastaser, og svulsten i nyren bliver dobbelt så stor.

Da onkologerne nu, i maj 09, havde accepteret patientens Temodalbehandling blev patienten fremover behandlet på Herlev med dette, og CT den 17.8 viste yderligere svind i metastaserne. Nyretumor er nu reduceret til 4,7 cm, og lungemetastaserne nærmest forsvundet helt. Også nærmest svind af de subkutane metastaser. Også udtalt regression af den store proces i mediastinum.

Patienten blev så glad over dette resultat, at han stoppede vore sideløbende behandlinger med bl.a mistelten.

CT den 23.10.09 viste fortsat regression, medens CT den 19.1.10 viste et mixed response med en vækst i mediastinum, men dog fortsat samlet regression.

Han kom på Humlegården ambulant den 5.2.10 og genoptog behandling med enzymer, LDN og vitamin D3.

Ved seneste kontakt med patienten den 26.04.10 har patienten det fint. Får fortsat Temodal 400 mg dgl i 5 dage med sædvanlig pause på 23 dage.

En CT scanning har for nylig vist, at der ikke længere resterer synligt tumor væv i kroppen, men han har udviklet en lille hjernemetastase på 2,2 x 1,5 cm, som sidder helt fortil i midten af hjernen. Det er planlagt at han skal have stereotaktisk strålebehandling på denne, ligesom han fik på en anden hjernemetastase et år tidligere.

Er nu også påbegyndt Curcumin og boswellia behandling,
ligesom han genoptager Celebrex behandlingen.