

# Humlegaarden



## **NON-HODGKIN LYMFOM OG RECTUM CANCER**

En dansk mand E.A. 64 år gammel, fik i oktober 2005 fjernet en polyp i endetarmen som viste sig at være et adenocarcinom, og efterfølgende foretog man CT-scanning i december 2005.

Denne undersøgelse viste store retroperitoneale (dvs. bag bughulen) lymfekirtelkonglomerater med kirtelstørrelse op til 2,5 cm. Desuden forstørrede kirtler i mesenteriet (tyndtarmskrøset). Enkelte forstørrede kirtler i begge lyskereioner op til 1,5 cm. Også synlige kirtler i armhulerne. Desuden en forstørret milt, 14,5 cm i største diameter.

Man fjernede en lymfeknude i venstre lyske den 16. december 2005 på 2x2 cm, og mikroskopien viste follikulært lymfom grad 1-2 senere ændret til grad IV-b.

Patienten var på ophold på Humlegaarden fra den 4. januar 2006 til den 25. januar 2006, og vi påbegyndte vor standardbehandling af lymfekræft med misteltenpræparatet Helixor P samt Colchicum, Capsicum, Astragalus og Cetraria islandica som injektion. Desuden med angiogenesehæmmeren Celebrex og LDN (lav dosis naltrexon). Et par uger efter udskrivningen skiftede vi til et andet mistelpræparat – Iscador P som patienten bedre tålte.

Efter to blodtransfusioner påbegyndte patienten kemoterapi den 2. marts 2006 med CVP og antistoffet Rituximab, og CT primo maj 2006 viser et blandet respons med let formindskede lymfeknuder bag bughulen, men til gengæld nyttilkomne lymfeknuder i armhuler og lyskereioner. Milten også mere voluminøs.

Patienten får herefter 6 R-CHOP behandlinger sidst, 27. juli 2006. CT viser yderligere tumorsvind i juni og august 2006, og man fortsætter med Rituximab hver 3. måned som vedligeholdelsesbehandling indtil februar 2007.

Man har en tumormarkør for lymfekræft, som hedder beta-2 mikroglobulin. Normalområdet på Hillerød sygehus er fra 84-180. Primo januar 2006 blev denne målt til 455, og medio februar 2006 før kemostart blev den målt til 852. Medio marts var den faldet til 666, men en uge senere var den steget til 1035, hvilket kan skyldes fænomenet surge eller flare up (se under tumormarkører). Lige siden er tumormarkøren faldet og var, ved den sidste måling den 16. september 2008 på 211, altså næsten i normalområdet. CT-scanning den 26. august 2008 viste intet abnormt.

# Humlegaarden



Bortset fra en depression i juli 2006, som hurtigt forsvandt, har patienten haft det særdeles fint under hele forløbet, således ved vor seneste kontakt med patienten 23. september 2008.

Han følger sin behandling med mistelten og øvrige lægeplanter samt LDN og Celebrex.