

Humlegaarden



Ondartet blærekræft

Hr. R.A. fra Sverige, født 1929, påbegyndte sin behandling på Humlegaarden i juni 1984. Han fik blod i urinen i jan. 1984, og man fandt en lavt differentieret (dvs. meget ondartet) blærekræft (urotelcellecancer) grad III med infiltrativ vækst, da man den 6. juni 1984 foretog TUR (transurethral resektion) af hans blærecancer. Man foretager derfor medio juli 1984 åben resektion af tumorområdet, og man fjerner også de tilgrænsende lymfekirtler. På Humlegaarden startede han behandling med misteltenpræparatet Helixor A samt diæt og diverse vitamin- og mineraltilskud. Frem til 1990 talrige lokale recidiver i blæren, beh. med såvel åbne som transurethrale resektioner. Man tilbød patienten fjernelse af urinblæren, men patienten sagde nej tak til dette. I denne periode skiftede han mellem at få misteltenpræparaterne Helixor A og Iscador QucArg. Han fik også injektioner med Echinacin. Han fik i slutningen af 1990 behandling i 6 uger med calmettevaccination BCG lokalt i blæren. Siden har der ikke været tegn på cancer hos denne patient. Han fortsatte med Helixor injektioner dagligt indtil 1993-1994. Han er blevet cystoskoperet 2 gange årligt og ved sidste cystoskopi i juli 2001 fik patienten besked på, at det ikke kun var lægevidenskaben, der havde helbredt ham. Det var også de højere magter, underforstået at man betragtede hans helbredelse som et mirakel. Vi så patienten og hans kone på besøg på Humlegaarden den 5. september 2001, og patienten fortalte, at han løber 6-7 km 3-4 gange om ugen, og at han altid har gjort dette. Han spiser vegetarisk og tager stadigvæk sine vitamin- og mineraltilskud. Patienten har en strålende almentilstand, og han og hans kone har i alle årene drevet et privat sygehjem Det gør de stadig, selvom de begge er over 70 år.