



## Prostata cancer

19-02-2010

### **PSA mindre end 0,5 i 4 år uden operation, lokal strålebehandling eller kastration.**

En nordmand, f. 1929, med stigende PSA fra 12 i 2001 til 25 i 2003, fik ved biopsi påvist prostatacancer i november 2004. PSA var da på 40. Adeno-carcinom med Gleasons score på 7. Man gav herefter én strålebehandling på begge bryster og påbegyndte Casodex (anti-androgen) behandling med 150 mg dagligt. Denne behandling blev stoppet i april 2005 på grund af smerter bag brystbenet. PSA var da på 4. Nogle måneder senere var PSA steget til 20, og patienten begyndte igen på Casodex 150 mg dagligt, og dette får han stadigvæk.

Han kom på ophold på Humlegården fra 16.01.2006 til 06.02.2006 med et kompleksbundet PSA på 1,6 og begyndte behandlingen med misteltenpræparatet Helixor A, og har siden fået dette i en dosis på 50 mg, 3 x per uge. Endvidere med alfa-reduktasehæmmeren Avodart 0,5 mg daglig, som han tog i den første tid efter hjemkomsten. Også behandlet med curbicin og curcumin (gurkemeje).

Siden opholdet har PSA været i niveauet 0,3 – 0,5, og ved vor seneste kontakt med patienten den 15.02.2010 havde patienten det fint og seneste PSA var på 0,5.