

Humlegaarden



Prostatacancer – PSA mindre end 0,1 efter 11 år

Patienten B.K. er nordmand fra 1932 og kom på Humlegården i marts 1997 efter at 4 biopsier fra prostata viste cancer. Den specifikke tumormarkør for prostatacancer "PSA" var på 18.

Han begyndte behandling med misteltenpræparatet Helixor A i stigende dosering sammen med enzymhæmmeren Proscar (finasterid). Knogleskanning gav ikke sikre holdepunkter for metastaser. Patienten ønskede ikke operation, strålebehandling, kryoterapi eller hormonbehandling. I juni 1997 var patientens PSA på 4,7, og i de følgende 3 år svingede PSA mellem 4 og 13. Steg imidlertid til 19,9 i november 2000 efter at han i et halvt år ikke havde taget Proscar. Pt. fik rosen på højre ben (en streptokokinfektion) i juli 2001 og lå i sengen i 3 uger med feber. Fik antibiotika. Herefter var PSA på 27.

Han begyndte først på Proscar igen i februar 2002, og PSA var da på 19,5. PSA var 29 i september 2002, hvorfor vi fordoblede Proscar dosis. Herefter faldt PSA først til 21 og siden til 18 i oktober 2003.

I juli 2004 stiger PSA til 26,3, hvorfor vi begynder behandling med antiandroget Casodex 50 mg daglig. En måned senere var der PSA faldt til 3,2, men en halv snes dage senere besvimer patienten pludseligt i hjemmet efter en krampefølelse bag brystbenet. Man finder en forsnævring i en af hjertets blodårer og indsætter et gitter i blodåren i december 2004. Patienten har ikke siden besvimelsen fået Casodex. PSA 16,7 i december 2004, og i juni 2005 29,6, hvorfor vi påbegynder behandling med plantepræparatet Prostatosol.

I august 2005 er PSA faldet til 0,2!

I efteråret 2005 reducerer han sin Prostatosol-dosis til 1 tbl. dgl. Og i januar 2006 var PSA gået op til 9,4 og i maj til 46,9. Vi skiftede nu fra Proscar til Avodart (som hæmmer begge 5-alfa reductase enzymer), øgede Prostatosol dosis til 3 x 3 dgl. igen og ordinerede marietidsel (Hepar 140 2 x 3 dgl.), som har en god virkning på prostatacancer, og patienten fortsatte med Helixor A 50 mg 3 gange per uge. Hans PSA den 2. august 2006 var nu igen faldet til 0,2, og patienten har det særdeles fint.

I november 2006 var PSA mindre end 0,1 – 1,3 i januar 2007 og 10,1 i april 2007, efter at han i en længere periode ikke har brugt Prostatosol.

Han starter på dette igen, og primo september og medio november 2007 var PSA igen mindre end 0,1. Alkalisk fosfatase normal.

Ved vor seneste kontakt med patienten ultimo februar 2008 har han det særdeles fint.

Resumé

Efter 11 år med prostatacancer er patientens PSA mindre end 0,1. Han er ikke blevet opereret eller har fået strålebehandling. Han har ikke fået hormonsprøjter og kun i 40 dage fået antiandroget Casodex i 2004, som han ikke kunne tåle.

Han har først fået Proscar og senere Avodart, som reducerer dihydro-testosteronet til 4 %. Desuden har han fået mistelteninjektioner samt plante-præparater. Siden 2005 fået Prostatosol i skiftende doseringer. Bortset fra hjerteoperationen i december 2004 efter den kortvarige Casodexbehandling har han i alle årene været frisk og fuldt arbejdsdygtig.