



---

## Tyktarmskræft med levermetastaser

Patienten, som er født i 1926, blev i januar 1996 opereret for en tyktarmskræft (i sigmoideum). 3 måneder senere måtte patienten reopereres efter forskellige postoperative komplikationer, og man fjernede nu hele højre side af tyktarmen (højresidig hemicolektomi), en del af tyndtarmen (jejunumresektion) og patienten fik tarmen lagt ud til en pose på maven (ileostomi). I december 1998 fandt man mange store levermetastaser, og man gav 6 kure med kemoterapi (5-FU og leukovoron) indtil maj 1999, hvor man stoppede behandlingen, da metastaserne ikke var blevet mindre. I august 1999 fik patienten genterapi med EIB-deleted adenovirus, men kun en behandling, da disse forsøg blev afbrudt. Siden har pt. enkelte gange været indlagt i forbindelse med stop af ileostomien. Pt. kom på Humlegården primo september 2000 og påbegyndte misteltenterapi med Helixor A og vore sædvanlige behandlinger med diverse lægeplanter for lever, og ved sidste kontakt medio december 2000 har patienten det rimeligt godt. Dette er interessant, fordi patienten på dette tidspunkt har haft store multiple levermetastaser i 2 år. Det gode resultat kan muligvis skyldes, at patienten samtidig med levermetastaserne opdages, blev sat i behandling med hjertemidlet digitalis i form af 250 mikrogram digoxin dgl., da man mente, at han havde et lidt for stort hjerte. Nyere forskning fra især Johan Haux i Trondheim har vist, at digitalis kan være et fremragende middel mod kræft. Vi ser igen en sygehistorie, hvor naturbehandling kan have en hurtig indsættende effekt.